

Mahdollisia terveysvaikutuksia:

- Hemorraginen kystiitti (tulehdus virtsarakon seinämässä, joka johtaa verenvuotoon).
- Virtsarakon seinämän paksuneminen.
- Vaikeudet tyhjentää virtsarakko.
- Virtsanpidätysongelmat.
- Tukos munuaisissa, virtsanjohtimessa, virtsarakossa tai virtsaputkessa.

Mahdolliset oireet:

- Tarve virtsata onnistumatta siinä.
- Tihentynyt virtsaaminen (erityisesti öisin).
- Vaikeudet virtsata.
- Vaikeudet tyhjentää rakko täysin.
- Turvotukset jaloissa, nilkoissa, säärissä, kasvoissa ja käsissä.
- Heikko tai olematon virtsarakon kontrolli.
- Verivirtsaisuus.

Myöhäisvaikutuksien riskit lisääntyvät, jos hoidossa on tarvittu:

- Virtsarakkoon kohdistunut leikkaus (poisto tai osapoisto)
- Lantion, selkärangan tai aivojen alueen leikkaus.
- Kemoterapia (syklofosfamidi, ifosfamidi)
- Sätehoito virtsarakon, lantion tai virtsatie-elimistön lähellä
- Kantasolusiirtohoito.

Ongelmia voidaan tutkia erilaisin keinoin:

- Lääkärintarkastus.
- Verikokeet.
- Virtsakokeet.
- Ultraäänitutkimus.